



クレマスチン錠1mg「日医工」

劇薬

クレマスチンシロップ0.01%「日医工」


劇薬

クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」

クレマスチンフマル酸塩錠・シロップ・ドライシロップ

薬価基準収載

標準品〈類似品〉：タベジール錠/シロップ、〈テルギンGドライシロップ〉



クレマスチン錠1mg「日医工」



クレマスチンシロップ0.01%「日医工」



Clemastine Fumarate

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2)閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕
- (3)前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者〔抗コリン作用により排尿障害が悪化するおそれがある。〕
- (4)狭窄性消化性潰瘍又は幽門十二指腸閉塞のある患者〔抗コリン作用により消化管運動が抑制され、症状が悪化するおそれがある。〕

効能・効果, 用法・用量, 禁忌等を含む使用上の注意の詳細はドラッグインフォメーションをご覧ください。

日医工株式会社

クレマスチン錠1mg「日医工」

クレマスチンシロップ0.01%「日医工」

クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」

Clemastine Fumarate

クレマスチンフマル酸塩錠・シロップ・ドライシロップ

※禁忌等を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。(詳細は添付文書をご参照ください。)

DRUG INFORMATION
ドラッグインフォメーション

2019年6月改訂(第2版)添付文書に基づいて作成

規 制 区 分	劇薬(シロップ0.01%, ドライシロップ0.1%)	日本標準商品分類番号	874419
貯 法	室温保存	承 認 年 月	2017年2月
使 用 期 限	外装に表示の使用期限内に使用すること。	承 認 番 号	錠1mg : 22900AMX00054000 シロップ0.01% : 22900AMX00052000 ドライシロップ0.1% : 22900AMX00053000
製 造 販 売 元	日医工株式会社	薬 価 収 載	2017年6月
		販 売 開 始	2017年6月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2)閉塞隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。]
- (3)前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者[抗コリン作用により排尿障害が悪化するおそれがある。]
- (4)狭窄性消化性潰瘍又は幽門十二指腸閉塞のある患者[抗コリン作用により消化管運動が抑制され、症状が悪化するおそれがある。]

品 名	クレマスチン錠 1mg「日医工」	クレマスチンシロップ 0.01%「日医工」	クレマスチンドライシロップ 0.1%「日医工」
有効成分	クレマスチンフマル酸塩		
含 量	1錠中 1.34mg (クレマスチンとして1mg)	1mL中 0.134mg (クレマスチンとして0.1mg)	1g中 1.34mg (クレマスチンとして1mg)
剤形・色調	白色の割線入素錠		
外 形		無色澄明の シロップ剤	白色の細粒状の ドライシロップ剤
識別コード	14A		
添 加 物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	白糖、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、pH調整剤、エタノール、香料	精製白糖、香料

錠1mg	アレルギー性皮膚疾患(蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、痒疹症)、アレルギー性鼻炎
シロップ0.01%・ ドライシロップ0.1%	アレルギー性皮膚疾患(蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、痒疹症)、アレルギー性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽

クレマスチン錠1mg「日医工」
1日量2錠(クレマスチンとして2mg)を朝晩2回に分けて経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

クレマスチンシロップ0.01%「日医工」
通常1日20mL(クレマスチンとして2mg)を2回に分けて経口投与する。
用量は患者の症状、年齢・体重などにより適宜増減することができる。
幼小児に対する標準的な用量として、下記の1日用量が定められる。

年 齢	1日用量
1歳以上3歳未満	4mL(クレマスチンとして0.4mg)
3歳以上5歳未満	5mL(クレマスチンとして0.5mg)
5歳以上8歳未満	7mL(クレマスチンとして0.7mg)
8歳以上11歳未満	10mL(クレマスチンとして 1mg)
11歳以上15歳未満	13mL(クレマスチンとして1.3mg)

1歳未満の乳児に使用する場合には、体重、症状などを考慮して適宜投与量を決める。
クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」
通常、成人は1日クレマスチンとして2mg(本剤2g)を朝晩2回に分けて経口投与する。
用量は患者の症状、年齢、体重などにより適宜増減する。
なお、用時水に溶かして用いる。
幼小児に対する標準的な用量として、下記の1日量を2回に分け、用時溶解して経口投与する。

年 齢	1日用量
1歳以上3歳未満	0.4g(クレマスチンとして0.4mg)
3歳以上5歳未満	0.5g(クレマスチンとして0.5mg)
5歳以上8歳未満	0.7g(クレマスチンとして0.7mg)
8歳以上11歳未満	1g(クレマスチンとして 1mg)
11歳以上15歳未満	1.3g(クレマスチンとして1.3mg)

なお、1歳未満の乳児に使用する場合には、体重、症状などを考慮して適宜投与量を決める。

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)てんかん等の痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者[痙攣閾値を低下させることがある。]
- (2)開放隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。]

2. 重要な基本的注意

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。

3. 相互作用
併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤 鎮静剤 催眠剤等 アルコール	中枢神経抑制作用が増強されることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	いずれも中枢神経抑制作用を有するため。
抗コリン剤 アトロピン等 MAO阻害剤	抗コリン作用が増強されることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	作用を増強させるため。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

- 1) **痙攣、興奮**：興奮があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと(乳児、幼児では特に注意すること)。
- 2) **肝機能障害、黄疸**：AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症 ^{注)}	発疹
精神神経系	眠気、浮動性めまい、頭重、倦怠感
消 化 器	悪心・嘔吐、口渇、食欲不振、下痢
肝 臓	AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、 γ -GTPの上昇

注)このような場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2)授乳中の婦人には投与することと避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[母乳中へ移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。[痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。]

8. 過量投与

- (1) **徴候、症状**：中枢神経抑制、興奮、口渇、瞳孔散大、潮紅、胃腸症状等
- (2) **処置**：一般的な薬物除去法(催吐、胃洗浄、活性炭投与等)により、除去する。また必要に応じて対症療法を行う。

9. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

安定性試験

クレマスチン錠1mg「日医工」：最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。
クレマスチンシロップ0.01%「日医工」：最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。
クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」：最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

クレマスチン錠1mg「日医工」
100錠(10錠× 10; PTP)
1000錠(10錠×100; PTP)
クレマスチンシロップ0.01%「日医工」
0.1mg/mL×500mL
クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」
1mg/g×100g(バラ)