



持続性抗ヒスタミン剤


日本薬局方 メキタジン錠

メキタジン錠

3mg「日医工」

薬価基準収載

標準品：ゼスラン錠，ニポラジン錠



メキタジン錠3mg「日医工」

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分，フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し，症状を悪化させることがある。〕
3. 前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者〔抗コリン作用により排尿困難等を起こすことがある。〕

効能・効果，用法・用量，禁忌等を含む使用上の注意の詳細はドラッグインフォメーションをご覧ください。

日医工株式会社

Mequitazine

日本薬局方 メキタジン錠

メキタジン錠3mg「日医工」

Mequitazine

メキタジン錠「日医工」
(01)14987376541913

※添付文書の改訂に十分ご留意ください。(詳細は添付文書をご参照ください。)

添付ナビ

▲添付文書関連情報はGS1コードから

貯 法	気密容器で室温保存、遮光保存	日本標準商品分類番号	874413
使用期限	外箱等に表示の使用期限内に使用すること	承認年月	2013年7月
製造販売元	日医工株式会社	承認番号	22500AMX01297000
		薬価収載	2013年12月
		販売開始	2013年12月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分、フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 閉塞隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。]
3. 前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者[抗コリン作用により排尿困難等を起こすことがある。]

組成・性状	販売名	メキタジン錠3mg「日医工」
	剤形・色調	白色、素錠
	有効成分の名称	日局 メキタジン
	含量(1錠中)	3mg
	添加物	D-マンニトール、トウモロコシデンプン、アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg
	外形	表面  質量: 約115mg 裏面  直径: 約7.0mm 側面  厚さ: 約2.3mm
	シート	PTP
	識別コード	O.S-MZ

効能・効果
気管支喘息、アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症)**用法・用量**
[気管支喘息の場合]
通常成人1回メキタジンとして6mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。
[アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症)の場合]
通常成人1回メキタジンとして3mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。

- 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)**
-
- (1)腎障害のある患者[長期投与例で臨床検査値異常としてBUN上昇がみられることがある。]
-
- (2)開放隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。]
-
- (3)高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
-
- 2. 重要な基本的注意**
-
- 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作には従事させないよう十分注意すること。
-
- 3. 相互作用**
-
- 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体、麻酔剤、麻薬性鎮痛剤、鎮静剤、精神安定剤等)フェノバルビタール等	眠気等があらわれることがあるので、減量するなど注意すること。	本剤の中枢神経抑制作用により、作用が増強されることがある。
抗コリン作用を有する薬剤(三環系抗うつ剤、MAO阻害剤等)イミプラミン塩酸塩、ブチルスコポラミン臭化物等	口渇、排尿困難等があらわれることがあるので、減量するなど注意すること。	本剤の抗コリン作用により、作用が増強されることがある。
メトキサレン	光線過敏症を起こすおそれがある。	これらの薬剤は光線感受性を高める作用を有する。
アルコール	眠気等があらわれることがあるので、アルコール含有清涼飲料水等の摂取に注意すること。	本剤の中枢神経抑制作用により、作用が増強されることがある。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)**1)ショック、アナフィラキシー**

ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、咽頭浮腫、蕁麻疹、嘔気等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2)肝機能障害、黄疸

AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。また、劇症肝炎の報告がある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

3)血小板減少

血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、光線過敏症
肝臓 ^{注2)}	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、黄疸
血液 ^{注1)}	血小板減少
精神神経系	眠気、倦怠感、ふらふら感、頭痛、めまい、興奮
消化器	口渇、胃部不快感、下痢、便秘、食欲不振、嘔吐、胃痛、腹痛
循環器	胸部苦悶感、心悸亢進
泌尿器	排尿困難
その他	咽頭痛、浮腫、顔面潮紅、視調節障害、月経異常、味覚異常、口内しびれ感

注1)発現した場合には投与を中止すること。

注2)観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

高齢者では副作用があらわれやすいので、注意すること。臨床試験において高齢者に口渇等の副作用の発現率が高い傾向が認められている。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

(2)授乳婦に投与する場合には授乳を中止させること。[動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験が少なくない)。

8. 過量投与**(1)徴候・症状**

誤って過量服用したときに眠気、悪心、嘔吐、軽度の抗コリン作用性障害がみられる。

(2)処置

通常、早期には催吐、胃洗浄を行う。必要に応じ補助呼吸又は人工呼吸、抗痙攣剤を投与する。

9. 適用上の注意**薬剤交付時:**

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

10. その他の注意

動物実験(ラット)でメラニンに対する親和性が認められている。また、他のフェノチアジン系化合物の長期投与又は大量投与により角膜・水晶体の混濁、網膜・角膜の色素沈着が報告されているので注意すること。

安定性試験

本品につき加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)を行った結果、メキタジン錠3mg「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

メキタジン錠3mg「日医工」
100錠(10錠×10; PTP)